

من عمر 75 فأكثر	60-74	من عمر 18 فأكثر	بالسنوات					بالشهور					بالأسابيع		العُمر	التطعيم							
			17	15-16	9-14	7-8	5-6	2-4	16-23	15	13-14	12	11*	8-10			5-7	4	3	2	06	00	
			J2		U11/J1	U10	U9	U7a/U8	U7								U6	U5		U4	U2/U3		
<p>الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (جرعة لمرة واحدة) ^a</p> <p>N</p>																							
<p>(G3) G2 ^b G1</p>																							
A ^g			N	A2	N	A1	N					d G3	N	G2	N	G1							
A ^g			N	A2	N	A1	N					d G3	N	G2	N	G1							
N	A3 ^g		N	A2	N	A1	N					d G3	N	G2	N	G1							
N			A1			N					d G3	N	G2	N	G1								
N			N					d G3	N	G2	N	G1											
S ⁱ			N					d G3	N	G2	N	G1											
N			N					e G3	N	G2	N	G1											
S ^h			N					G2	N	G1													
N			N					G2	N	G1													
N			N					G2	N	G1													
N			N					G1															
S ^j			G ^j																				
N			G1 G2 ^{k k}																				
S ^l																							
S ^l																							

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)
الفيروسات العجلية
الكزاز (التيتانوس) ^c
الخنق (الدفتيريا) ^c
السعال الديكي ^c الشاهوق (بيرتوسيس)
المستديمة النزلية النوع ب (Hib) ^c المستديمة النزلية نوع ب
شلل الأطفال ^c شلل الأطفال (بوليومييليتيس)
التهاب الكبد نوع ب ^c
المكورات الرئوية ^c
المكورات السحائية ب ^c
مرض الحصبة
النكاف والحصبة الألمانية
مرض الحماق (الحماق)
المكورات السحائية (نوع ج) ^c
فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
فيروس الورم الحليمي البشري
كوفيد-19
الحلأ النطاقي (الهربس)
الزكام (الإنفلونزا)
الفيروس المخلوي التنفسي (التطعيم)

J فحص الشباب (في الفترة العمرية 12-14 سنة)
U الفحص الاستباقي للكشف المبكر (التطعيم الأساسي لجميع الذين لم يتم تطعيمهم بعد، أو استكمال سلسلة التطعيمات غير المكتملة)
N الحصول على التطعيم في وقت لاحق (التطعيم الأساسي لجميع الذين لم يتم تطعيمهم بعد، أو استكمال سلسلة التطعيمات غير المكتملة)
A تجديد التطعيم
S التطعيم المعياري
G التطعيم الأساسي (خلال الفترة لما يصل إلى 3 جرعات تطعيم جرثومة G3 - G1)
J فحص الشباب (في الفترة العمرية 12-14 سنة)
U الفحص الاستباقي للكشف المبكر (التطعيم الأساسي لجميع الذين لم يتم تطعيمهم بعد، أو استكمال سلسلة التطعيمات غير المكتملة)
N الحصول على التطعيم في وقت لاحق (التطعيم الأساسي لجميع الذين لم يتم تطعيمهم بعد، أو استكمال سلسلة التطعيمات غير المكتملة)
A تجديد التطعيم
S التطعيم المعياري
G التطعيم الأساسي (خلال الفترة لما يصل إلى 3 جرعات تطعيم جرثومة G3 - G1)



- a** **الفيروس المخلوي التنفسي "RSV" (الأجسام المضادة وحيدة النسيلة):** يجب على الأطفال الذين ولدوا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر الحصول على دواء نيرسيفيماب "nirsevimab" في الخريف قبل بداية موسم الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي "RSV" الأول؛ يجب أن يحصل المواليد الجدد في أي عمر والذين ولدوا خلال موسم العدوى بالفيروس المخلوي التنفسي "RSV" (عادة في الفترة بين أكتوبر ومارس) على دواء نيرسيفيماب "nirsevimab" في أقرب وقت ممكن بعد الولادة، ويفضل عند الخروج من مستشفى الولادة أو في U2 (الأيام من 3 إلى 10 من ولادتهم).
- b** **لقاح الروتا:** جرعة اللقاح الأولى من عمر 6 أسابيع، حسب اللقاح المستخدم 2 أو 3 جرعات لقاح على فترة زمنية لا تقل عن 4 أسابيع.
- c** **الختناق والكزاز والشاهوق (السعال الديكي) وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع ب (Hib) والتهاب الكبد الوبائي ب/لقاح المكورات الرئوية:** الأطفال الخدج: جرعة لقاح إضافية عند عمر 3 أشهر، أي 4 جرعات لقاح في المجموع.
- d** **الختناق والكزاز والشاهوق (السعال الديكي) وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع ب (Hib) والتهاب الكبد الوبائي ب/لقاح المكورات الرئوية:** أدنى فترة زمنية للجرعة السابقة: 6 شهور.
- e** **لقاح بكتيريا المكورات السحائية:** 3 جرعات تُؤخذ من سن شهرين إلى 23 شهرًا؛ ومن سن 24 شهرًا، وتتألف سلسلة التطعيم من جرعتين.
- f** **لقاح فيروس الورم الحليمي البشري:** جرعتان من اللقاح على فترة زمنية لا تقل عن 5 أشهر، مع التطعيم التعويضي بدءًا من عمر فوق 14 عامًا أو بفواصل تطعيم زمني أقل من 5 أشهر بين الجرعة الأولى والثانية. الجرعة الثالثة ضرورية.
- g** **اللقاح الثلاثي البكتيري:** التطعيم المعزز ضد مرض التيتانوس والدفتيريا (Td) كل 10 سنوات. التطعيم التالي الواجب هو لقاح ضد مرض التيتانوس والدفتيريا (Td) مرة واحدة في صورة لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي أو، إذا تم تحديده، كتطعيم التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي - شلل الأطفال معطل النشاط المركب.
- h** **لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية:** التطعيم الفدي بلقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لجميع الأشخاص المولودين بعد 1970 الذين يبلغ عمرهم ≤ 18 عامًا مع حالة تطعيم غير واضحة، بدون تطعيم أو مع تطعيم واحد فقط في الطفولة.
- i** **لقاح المكورات الرئوية:** يُوصى بأخذه مع لقاح المكورات الرئوية (PCV 20).
- j** **كوفيد 19:** لحماية الأشخاص الذين لا يعانون من مرض كامن، من الأهمية بمكان الحصول على (على الأقل) 3 مستضدات، منها تطعيم واحد على الأقل.
- k** **لقاح فيروس الهربس النطاقي:** يلزم مواجهة المستضد ثلاث مرات (على الأقل)، لحماية الأفراد غير المصابين بالمرض الأساسي، ويجب أن تكون واحدة منها على الأقل في شكل تطعيم. التطعيم بلقاح الـ 23 عديد السكاريد.
- l** **الفيروس المخلوي التنفسي (التطعيم):** تلقي التطعيم لمرة واحدة بلقاح الفيروس المخلوي التنفسي القائم على البروتين في أواخر الصيف/الخريف قبل بداية موسم العدوى بالفيروس المخلوي التنفسي.

* يمكن توزيع التطعيمات على عدة مواعيد تطعيم. يمكن إعطاء MMR وV في نفس التاريخ أو كل 4 أسابيع.

مواعيد التطعيم التالية

