



بزرگتر 75 سال و	بر حسب سال							بر حسب ماه							بر حسب هفته				
	60-74	17	15-16	9-14	7-8	5-6	2-4	16-23	15	13-14	12	11*	8-10	5-7	4	3	2	06	00
بزرگتر		J2		U11/J1	U10	U9	U7a/U8	U7			U6		U5			U4		U2/U3	

سن

واکسیناسیون

بر حسب سال	بر حسب ماه	بر حسب هفته	توصیحات
	N	آنتی بادی‌های مونوکلونال (تک دوز) <sup>a</sup>	RSV
		(G3) G2 G1 <sup>b</sup>	روتاویروس‌ها
<sup>g</sup> A	N	A2 N A1	کزاز <sup>c</sup>
<sup>g</sup> A	N	A2 N A1	دیفتری <sup>c</sup>
N <sup>g</sup> A3	N	A2 N A1	سیاه سرفه <sup>c</sup>
		N	Hib <sup>c</sup> هموفیلوس آنفلوانزای نوع b
N	A1	N	فلج اطفال <sup>c</sup>
		N	هیپاتیت B <sup>c</sup>
<sup>i</sup> S		N	پنوموکوک‌ها <sup>c</sup>
		N	مننگوکوک B <sup>c</sup>
<sup>h</sup> S		N	سرخک
		N	اوربون، سرخچه
		N	آبله مرغان واریسلا
		N	منئزوکوک‌های C <sup>c</sup>
	N	<sup>f</sup> <sup>f</sup> G1 G2	HPV ویروس‌های پاپیلوما‌ی انسانی
<sup>j</sup> S (سالانه) <sup>j</sup> G			کووید ۱۹
N <sup>k</sup> <sup>k</sup> G1 G2			هریس زوستر (زونا)
S (سالانه)			گریپ آنفلوانزا
<sup>l</sup> S			RSV (واکسیناسیون)

توصیحات
RSV
روتاویروس‌ها
کزاز <sup>c</sup>
دیفتری <sup>c</sup>
سیاه سرفه <sup>c</sup>
Hib <sup>c</sup> هموفیلوس آنفلوانزای نوع b
فلج اطفال <sup>c</sup>
هیپاتیت B <sup>c</sup>
پنوموکوک‌ها <sup>c</sup>
مننگوکوک B <sup>c</sup>
سرخک
اوربون، سرخچه
آبله مرغان واریسلا
منئزوکوک‌های C <sup>c</sup>
HPV ویروس‌های پاپیلوما‌ی انسانی
کووید ۱۹
هریس زوستر (زونا)
گریپ آنفلوانزا
RSV (واکسیناسیون)

**J** معاینه جوانان (J1 در سنین 14-12 سالگی)

**U** معاینه تشخیصی زودهنگام

**N** واکسیناسیون جبرانی (این‌سازی پایه تمام افرادی که تا کنون واکسینه نشده‌اند یا تکمیل یک سری واکسیناسیون ناقص)

**A** واکسیناسیون یادآوری

**S** واکسیناسیون استاندارد

**G** این‌سازی پایه (در حداکثر 3 نوبت واکسیناسیون G1-G3)



- a** RSV (آنتی‌بادی‌های مونوکلونال): mirsevimb باید به متولدین بین آوریل و سپتامبر در پاییز قبل از شروع اولین هفته آنها تزریق شود. فصل دریافت RSV: نوزادان در هر سن حاملگی طی فصل RSV (معمولاً بین اکتبر و مارس) متولد می‌شوند، باید در اسرع وقت پس از تولد، mirsevimb تزریق نمایند؛ به‌طور ایده‌آل این مورد پس از ترخیص از مرکز زایمان یا در U2 (10-3 روز زندگی) انجام می‌شود.
- b** روتا - واکسن روتاویروس: دوز اول واکسن از سن 6 هفتهگی به بالا، بسته به واکسن مورد استفاده 2 یا 3 دوز واکسن در فاصله زمانی حداقل 4 هفته.
- c** کزاز، دیفتری، سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا نوع b، فلج اطفال غیرفعال، هیپاتیت B و واکسن: نوزادان زودرس: دوز تکمیلی واکسن در سن 3 ماهگی، یعنی در مجموع 4 دوز واکسن.
- d** کزاز، دیفتری، سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا نوع b، فلج اطفال غیرفعال، هیپاتیت B و واکسن: حداقل فاصله زمانی تا دوز قبلی: 6 ماه.
- e** واکسن مننگوکوک B: 3 دوز در سن 2 تا 23 ماهگی؛ از سن 24 ماهگی به بعد، مجموعه واکسیناسیون شامل 2 دوز می‌شود.
- f** واکسن ویروس پاپیلوماهای انسانی: دو دوز واکسن در فاصله زمانی حداقل 5 ماه، در مورد واکسیناسیون جبرانی که در سن بالای 14 سال آغاز می‌شود یا در فاصله زمانی واکسیناسیون کمتر از 5 ماه بین دوز اول و دوم، دوز سوم ضروری است.
- g** واکسن کزاز، دیفتری و سیاه سرفه بدون سلول: واکسیناسیون یادآوری کزاز و دیفتری (Td) هر 10 سال، واکسیناسیون ضروری بعدی کزاز و دیفتری (Td) 1 بار به صورت واکسیناسیون کزاز، دیفتری و سیاه سرفه (Tdap) یا در صورت تجویز مربوطه به صورت واکسیناسیون ترکیبی کزاز، دیفتری و سیاه سرفه (Tdap) و واکسن غیر فعال در برابر بیماری فلج اطفال (IPV).
- h** واکسن سرخک، اوریون و سرخچه: یک بار واکسیناسیون با واکسن سرخک، اوریون و سرخچه (MMR) برای همه افراد متولد شده پس از سال 1970 در سن 18 سال یا بالاتر از آن با وضعیت واکسیناسیون نامشخص، بدون واکسیناسیون یا با فقط یک واکسیناسیون در دوران کودکی.
- i** واکسن پنوموکوک: توصیه شده با PCV20.
- j** COVID19: جهت محافظت از افراد بدون بیماری زمینهای، حداقل 3 تماس آنتیژن ضروری است که حداقل 1 مورد آن باید واکسیناسیون باشد.
- k** واکسن هریس زوستر (روتا): برای محافظت از اشخاص بدون بیماری زمینهای، (حداقل) 3 تماس آنتی‌ژنی لازم است، حداقل یکی از آن‌ها باید واکسیناسیون باشد.
- l** RSV (واکسیناسیون): 1 بار واکسیناسیون با واکسن RSV مبتنی بر پروتئین در اواخر تابستان/پاییز قبل از شروع فصل RSV.
- \* واکسیناسیون‌ها ممکن است به چندین زمان واکسیناسیون تقسیم شوند. واکسن سرخک، اوریون و سرخچه (MMR) و واریسلا (V) در یک زمان یا در فاصله زمانی 4 هفته‌ای قابل تزریق هستند.

## زمان‌های بعدی واکسیناسیون

