

# AŞI TAKVİMİ

Aşılar ve pasif bağışıklamalar

Sprache: Türkisch

Aşılamalar ve pasif bağışıklamalar mümkün olan en erken zamanda yapılmalıdır.

Aşı durumunun gözden geçirilmesi her yaşta tavsiye edilir ve faydalıdır. Eksik aşılar, ilgili yaş grubu için önerilere göre derhal uygulanmalıdır.

Daimi Aşı Komisyonu'nun (STIKO) tavsiyeleri  
(STIKO), 2025. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



AŞI	YAŞ	hafta		ay								yıl											
		00	06	2	3	4	5-7	8-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	≥ 18	60-74	≥ 75	
		U2/U3		U4		U5		U6				U7		U7a/U8		U9		U10		U11/J1		J2	
RSV		Monoklonal Antikorlar (Tek Doz) <sup>a</sup>								N													
Rotavirüsler		G1 <sup>b</sup>		G2	(G3)																		
Tetanos <sup>e</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>d</sup>	N								A1	N	A2	N	A <sup>g</sup>				
Difteri <sup>c</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>d</sup>	N								A1	N	A2	N	A <sup>g</sup>				
Öksürüklü Boğmaca <sup>e</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>d</sup>	N								A1	N	A2	N	A3 <sup>g</sup>	N			
Haemophilus influenzae Tip b <sup>c</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>d</sup>	N																
Çocuk felci <sup>e</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>d</sup>	N								A1	N							
Hepatit B <sup>c</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>d</sup>	N																
Pnömonok <sup>c</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>d</sup>	N								S <sup>i</sup>								
Meningokok B <sup>e</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>e</sup>		N															
Kızamık						G1	N	G2	N								S <sup>h</sup>						
Kabakulak, kızamıkçık						G1	N	G2	N														
Suçiçeği virüsü						G1	N	G2	N														
Meningokok C						G1	N																
İnsanlarda görülen papilloma virüsleri										G1 G2 <sup>f</sup>		N											
COVID 19														G <sup>i</sup>				S <sup>j</sup> (her yıl)					
Zona														G1 G2 <sup>k</sup>				N					
Enflüanza																		S (her yıl)					
RSV (Aşılama)																		S <sup>l</sup>					

## AÇIKLAMALAR

**G** TEMEL AŞILAMA  
(3 adede kadar kısmi aşılamada  
G1 - G3)

**S** STANDART AŞILAMA

**A** TAZELEME AŞISI

**N** TAKİP AŞILARI  
(Henüz aşılanmamış insanlar veya temel aşılama yapılacak insanların tamamlanmamış bir aşılama serisinin tamamlanması)

**U** Erken teşhis muayenesi

**J** Gençlerde yapılan araştırma  
(12-14 yaşta J1)

## Daimi Aşı Komisyonu'nun (STIKO) tavsiyeleri

(STIKO), 2025. www.stiko.de



- a RSV (Monoklonal Antikorlar):** Nisan ve Eylül ayları arasında doğan bebeklere, 1. RSV sezonlarının başlamasından önceki sonbaharda nirsevimab verilmelidir; RSV sezonunda (genellikle Ekim ve Mart ayları arasında) doğacak olup herhangi bir gebelik yaşındaki yenidoğanlara, doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede, ideal olarak doğum merkezinden taburcu edilirken veya U2 muayenesi sırasında (yaşamın 3.-10. günü) nirsevimab verilmelidir.
- b Rota:** Kullanılan aşıya bağlı olarak 6 haftalık bebeklerden itibaren en azından 4 hafta arayla 2 veya 3 aşılama dozu.
- c TdaPHibIPV/HepB/Pnc:** Prematüre doğanlar: 3 aylıkken ek aşı dozu, yani toplam 4 aşı dozu.
- d TdaPHibIPV/HepB/Pnc:** Önceki aşidan sonra minimum süre: 6 ay
- e MenB:** 2 ila 23 aylıkken 3 doz; 24 aylıktan itibaren aşı serisi 2 doz olmalıdır.
- f HPV:** En azından 5 ay arayla iki aşı dozu,  $\geq 15$  yaştan itibaren veya 1. ve 2. Doz arasında  $< 5$  aydan az süreyle takip aşısı yapıldığında 3. doz aşının yapılması gereklidir.
- g Td(ap):** Her 10 yılda bir Td yenileme aşısı. Daha sonraki Td aşısı bir kez Tdap olarak veya ilgili endikasyon görülürse Tdap-IPV kombinasyon aşısı olarak yapılır.
- h MMR (Kızamık, kabakulak, kızamıkçık):** 1970 yılından sonra doğmuş, 18 yaşını geçkin ve aşı durumu belirsiz, aşı olmamış veya çocuklukta tek bir aşı yapılmış tüm kişiler için bir MMR aşısı ile tek seferlik aşılama yapılması gereklidir.
- i Pnc:** PCV20 ile aşılama.
- j COVID19:** Alta yatan bir hastalığı olmayan bireylerin korunması için, en az biri aşı olmak üzere (en az) 3 antijen teması gerekmektedir.
- k H. zoster:** Adjuvanlanmış zona aşısı ile en az 2 ila maksimum 6 aylık aralıklarla iki kez aşılama.
- l RSV (Aşılama):** RSV sezonunun başlamasından önce yaz sonu/sonbaharda protein bazlı bir RSV aşısıyla tek seferlik aşılama

\* Aşılar birkaç aşı randevusuna yayılabilir. MMR ve Suçiçeği aşısı aynı tarihte veya 4 hafta arayla verilebilir

## Sonraki aşı tarihleri

.....

.....

.....

