

# КАЛЕНДАР ЩЕПЛЕНЬ

Вакцинація та пасивна імунізація

Sprache: Ukrainisch

ВАКЦИНАЦІЯ ВІК

**Вакцинація та пасивна імунізація мають бути проведені якомога раніше.**  
Доцільно перевіряти статус вакцинації у будь-якому віці. Пропущені щеплення необхідно негайно зробити повторно згідно з рекомендаціями для відповідного віку.

Рекомендації постійної комісії з вакцинації (STIKO), 2025. [www.stiko.de](http://www.stiko.de)

ROBERT KOCH INSTITUT



у тижнях			у місяцях							у роках											
00	06	2	3	4	5-7	8-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	≥ 18	60-74	≥ 75	
U2/U3		U4		U5			U6		U7			U7a/U8		U9		U10		U11/J1		J2	

PCB	Моноклональні антитіла (одноразова доза) <sup>a</sup>																						
Ротавіруси	G1 <sup>b</sup>		G2	(G3)																			
Правець <sup>c</sup>	G1		N	G2	N	G3 <sup>d</sup>		N			A1	N	A2		N	A <sup>g</sup>							
Дифтерія <sup>c</sup>	G1		N	G2	N	G3 <sup>d</sup>		N			A1	N	A2		N	A <sup>g</sup>							
Коклюш <sup>e</sup>	G1		N	G2	N	G3 <sup>d</sup>		N			A1	N	A2		N	A3 <sup>g</sup>	N						
Гемофільна інфекція <sup>c</sup> Тип В	G1		N	G2	N	G3 <sup>d</sup>		N															
Поліомієліт <sup>e</sup>	G1		N	G2	N	G3 <sup>d</sup>		N							A1	N							
Гепатит В <sup>c</sup>	G1		N	G2	N	G3 <sup>d</sup>		N															
Пневмокок <sup>c</sup>	G1		N	G2	N	G3 <sup>d</sup>		N										S <sup>i</sup>					
Менінгокок В <sup>e</sup>	G1		N	G2	N			G3 <sup>e</sup>	N														
Кіп						G1	N	G2	N							S <sup>h</sup>							
Свинка, краснуха						G1	N	G2	N														
Вітряна віспа						G1	N	G2	N														
Менінгокок С								G1	N														
Вірус папіломи людини															G1 G2 <sup>f</sup>	N							
Коронавірусне																		G <sup>i</sup>	S <sup>j</sup> (щороку)				
Оперізуючий герпес																			G1 G2 <sup>k</sup>	N			
Інфлюєнца																			S (щороку)				
PCB (вакцинація)																				S <sup>l</sup>			

ПОЯСНЕННЯ

**G** БАЗОВА ІМУНІЗАЦІЯ

(до 3-х часткових щеплень

G1 - G3)

**S** СТАНДАРТНА ВАКЦИНАЦІЯ

**A** РЕВАКЦИНАЦІЯ

**N** ПОСЛІДУЮЧА ВАКЦИНАЦІЯ

(Базова імунізація всіх ще не вакцинованих або

Завершення неповної серії вакцинації)

**U** Скринінгове обстеження

**J** Обстеження підлітків

(J1 у віці 12–14 років)



- Ⓐ **PCB (моноклональні антитіла):** Народжені в період з квітня по вересень повинні отримати нірсевімаб восени, перед початком першого сезону PCB; Новонароджені будь-якого гестаційного віку, що народилися в сезон PCB (зазвичай з жовтня по березень), повинні отримати нірсевімаб у найкоротші терміни після народження, в ідеалі при виписці з пологового будинку або в період U2 (з 3 по 10 день життя).
- Ⓑ **Rota:** Перша доза вакцини з 6-тижневого віку, залежно від вакцини, 2-а чи 3-я доза вакцини з інтервалом не менш 4 тижнів.
- Ⓒ **TdapHibIPV/НерВ/Пnc:** Недоношені діти: додаткова доза вакцини у віці 3 місяців, тобто лише 4 дози вакцини.
- Ⓓ **TdapHibIPV/НерВ/Пnc:** Мінімальний інтервал від попередньої дози: 6 місяців.
- Ⓔ **MenВ:** 3 дози у віці від 2 до 23 місяців; з 24 місяців серія вакцинацій складається з 2 доз.
- Ⓕ **HPV:** Дві дози вакцини з інтервалом не менше 5 місяців, з додатковою вакцинацією, починаючи від 15 років або з інтервалом між вакцинаціями менше 5 місяців між 1-ою та 2-ою дозами потрібна 3-я доза.
- Ⓖ **Td(ap):** Ревакцинація Td (проти правця й дифтерії) кожні 10 років. Наступна обов'язкова вакцинація Td - разова вакцинація як Tdap (проти правця, дифтерії, коклюшу) або, за наявності показань, комбінована вакцинація Tdap-IPV (проти правця, дифтерії, коклюшу й поліомієліту).
- Ⓗ **MMR:** Разова вакцинація вакциною MMR (проти кору, свинки, краснухи) для всіх осіб, що народилися після 1970 р. ≥ 18 років з неясним статусом щеплення, без щеплення або тільки з одним щепленням у дитинстві.
- Ⓘ **Пnc:** Рекомендується з PCV20.
- Ⓜ **COVID-19:** Для захисту осіб без основного захворювання необхідні (принаймні) 3 контакти з антигеном, принаймні один з яких унаслідок вакцинації.
- Ⓝ **Н. zoster:** Дворазова вакцинація ад'ювантною вакциною проти оперізувального герпесу (інактивованою вакциною) з інтервалом від 2 до 6 місяців.
- Ⓟ **PCB (вакцинація):** Одноразова вакцинація білковою вакциною проти PCB наприкінці літа/осені перед початком сезону PCB.

\* Вакцинацію можна робити в кілька прийомів. MMR (проти кору, свинки, краснухи) та V можна призначати на один день або з інтервалом у 4 тижні.

## ТЕРМІНИ НАСТУПНОЇ ВАКЦИНАЦІЇ

